




IGEA

INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA Y
ENDOSCOPIA DE AVANZADA

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG)



En este documento encontrará la información necesaria referente a la **GASTROSTOMÍA (PEG)**:

¿Qué es la Gastrostomía?

¿Cómo se realiza?

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Gastrostomía?

¿Cómo debo cuidar el tubo de PEG?

¿Hay complicaciones tras la colocación del tubo de PEG?


¿Cuánto duran las sondas y cómo se retiran?



El paciente o la persona responsable recibirá toda la información verbal y escrita sobre el procedimiento, las indicaciones propias de la preparación y recaudos correspondientes, debiendo finalmente firmar el consentimiento informado. Si posteriormente requiere más información puede comunicarse con su médico.

¿Qué es la Gastrostomía?

Es un procedimiento mediante el cual se coloca un tubo flexible de alimentación a través de la pared abdominal hasta el estómago. Permite la nutrición, la administración de líquidos y/o medicamentos directamente en el estómago, sin pasar por la boca y el esófago.



¿Cómo se realiza?

Es un procedimiento que requiere internación para control, por lo menos de 24 hs. Se realiza mayormente en la sala de endoscopías o en el quirófano. Con el paciente acostado boca arriba, el anestesiólogo aplica la medicación. Si bien estará respirando por sus propios medios, no verá, escuchará ni sentirá nada durante el examen. Una vez que el paciente está dormido, se introduce el endoscopio en la cavidad oral para luego avanzar el instrumento hacia el estómago. El médico utilizará el endoscopio como guía para crear una pequeña abertura en la piel del abdomen directamente hacia el estómago. Este procedimiento le permite al médico colocar y asegurar un tubo de alimentación en el estómago. El estudio dura 40 minutos, aproximadamente. En algunos casos, el paso del endoscopio o la sonda a lo largo de la totalidad del tracto

digestivo, no puede lograrse por razones patológicas, anatómicas o técnicas. Luego del examen será controlado en el área de recuperación hasta que la mayoría de los efectos de la anestesia hayan desaparecido y luego regresará a su habitación. Es común que sienta alguna molestia en la garganta debido al paso de la sonda. La misma le irá desapareciendo a medida que transcurren las horas. También es posible que tenga sensación de hinchazón abdominal debido al aire introducido durante el examen. Al día siguiente se le realizará una prueba de tolerancia infundiéndolo, por la sonda de gastrostomía, solución de Dextrosa y luego el alimento enteral en baja cantidad. Si el mismo es bien tolerado se le otorgará el alta hospitalaria. Deberá completar un esquema de antibióticos por 10 días y acudir a control en 15 días.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Gastrostomía?

Los pacientes que tienen dificultad para tragar, problemas con el apetito o la imposibilidad de nutrirse de manera suficiente por vía oral pueden beneficiarse con este procedimiento.

¿Cómo debo cuidar el tubo de PEG?

Para cuidar la herida en piel se debe limpiar la misma diariamente con agua y jabón. Posteriormente se utiliza una gasa con alcohol, se deja secar el alcohol y finalmente se coloca una gasa seca. Se debe prestar especial atención en mantener el reparo externo a la distancia en cm informada por el médico. Luego de pasar el alimento o medicación (triturada) por el canal que dice FEED, se debe limpiar la sonda con 3 jeringas de 20 ml de agua. Para esto se debe utilizar el canal que dice FLUSH. Si hay solo un canal, usar el mismo por donde pasa el alimento.



¿Hay complicaciones tras la colocación del tubo de PEG?

Puede haber complicaciones debidas a la colocación de la sonda de gastrostomía, sin embargo son infrecuentes. Las posibles complicaciones incluyen dolor, infección o sangrado en el sitio de la sonda, fuga del contenido estomacal alrededor del sitio del tubo y que el tubo se salga o funcione mal. Por lo tanto, ante la presencia de dolor abdominal fuerte, sangrado o fiebre, deberá concurrir a la guardia y comunicarse con su médico inmediatamente a los teléfonos que se encuentran en el dorso del informe que se le ha entregado.

¿Cuánto duran las sondas y cómo se retiran?

Los tubos de PEG duran meses o años. Sin embargo, debido a que, con el tiempo y mala limpieza, la sonda se puede romper u obstruir, puede ser necesario reemplazarla. Su médico puede sacar o reemplazar el tubo fácilmente sin sedantes ni anestesia, aunque puede optar por usar sedantes y endoscopía en algunos casos. El médico sacará el tubo con tracción firme e introducirá un nuevo tubo o cerrará la abertura si no es necesario reemplazarlo. Los sitios de la PEG se cierran rápidamente una vez que se saca el tubo, por lo tanto, si un tubo se sale accidentalmente, esto exige atención inmediata. Se debe tener especial cuidado que la sonda no se salga durante el primer mes ya que es el tiempo que tarda en formarse la comunicación entre la piel y el estómago.

NOTA

Tenga en cuenta que ante una eventual demora en brindarle nuestros servicios, la misma corresponderá a la naturaleza del acto médico que realizamos (en ocasiones imprevistos) y a los esfuerzos que hacemos para brindar la mejor calidad de atención posible a cada uno de nuestros pacientes.



IGGEA

INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA Y
ENDOSCOPÍA DE AVANZADA

Calidad, Seguridad y Prestigio

 291-4851601  291-5100160

institutoigea@gmail.com / www.institutoigea.com

General Paz 429, piso 3.